DEMENTIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die heel specifieke zenuwcellen in de hersenen aantast (het dopaminerge systeem). Het ziekteverloop wordt gekenmerkt door veranderingen in het centrale zenuwstelsel die vooral motorische stoornissen veroorzaken. Naarmate de ziekte vordert, kan de toestand van de persoon evolueren naar een dementiesyndroom: dementie bij de ziekte van Parkinson, of parkinsondementie.

De oorzaken

De ziekte van Parkinson kan in sommige gevallen tot een dementiesyndroom leiden. In die gevallen zouden zich Lewy-lichaampjes ontwikkelen, net als bij de gelijknamige vorm van dementie. Deze Lewy-lichaampjes vormen zich dan vooral in de substantia nigra van de hersenen.

De symptomen

De symptomen omvatten:

- Een parkinsonsyndroom (beven in rust, algemene vertraging, motorische stijfheid…)
- Aandachtsstoornissen
- Geheugenverlies (minder uitgesproken dan bij de ziekte van Alzheimer, met behouden herkenningsvermogen)
- Stoornissen in het redeneren, de flexibiliteit, planning en oordeelsvorming (vroeger optredend en ernstiger dan bij de ziekte van Alzheimer)
- Veranderingen in stemming en persoonlijkheid

De diagnose

In het algemeen kunnen criteria zoals de aanwezigheid van de ziekte van Parkinson en het tijdens die ziekte ontstaan van verlies van functionele zelfstandigheid, een afname van dagelijkse activiteiten en cognitieve stoornissen die het dagelijks leven beïnvloeden, leiden tot de diagnose parkinsondementie.

De behandelingen

Naast de specifieke behandelingen voor de ziekte van Parkinson blijft de medicamenteuze behandeling van parkinsondementie delicaat. Acetylcholinesteraseremmers lijken mogelijk nuttig en één bepaald atypisch antipsychoticum zou kunnen helpen om eventuele hallucinaties onder controle te houden. Er zijn weinig studies uitgevoerd binnen dit specifieke domein, waardoor voorzichtigheid geboden blijft.

Niet-medicamenteuze begeleiding en ondersteuning blijven uiteraard aangewezen.

Parkinsondementie in cijfers

Dementie zou voorkomen bij 40% van de mensen met Parkinson, doorgaans 10 tot 15 jaar na het ontstaan van de motorische stoornissen.

Bronnen

- Association Parkinson ASBL
- Meyniel C, Damier P - Démence à corps de Lewy et démence associée à la maladie de Parkinson. La Presse Médicale, 2007, Vol. 36, N° 10, Part. 2, 1485-1490
- Geny C - Démence parkinsonienne et démence à Corps de Lewy, Neurologie.com, 2009, 1 (5): 149-53

© All rights reserved